

Eficacia del belimumab en el tratamiento de la nefropatía lúpica. Serie de casos.

Sbardella Sánchez, Gabriel¹; Prados Soler, María Carmen¹; Delgadillo Limón, Marco Valentín¹; Panadero Moya, Marta¹.

(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS

Palabras clave / Términos relevantes:

Nefropatía Lúpica, Belimumab.

RESUMEN

Introducción: La nefritis lúpica (NL) es una de las manifestaciones más frecuentes. Representa un importante factor de riesgo de morbilidad y mortalidad. Objetivo: Describir la disminución de antiDNA y proteinuria en los pacientes diagnosticados de nefropatía lúpica clase III-IV al añadir Belimumab.

Caso clínico y resultados: Pacientes con terapia estándar con:

1.- Proteinuria de 5927 mg/g y anticuerpos antiDNA no constaban. Tras el inicio de Belimumab, presenta en seguimiento en consulta de mejoría de CAC de 620.3, antiDNA 21.

2.- Proteinuria de 1324mg/g, anticuerpos antiDNA de >300, presenta recaída en 07/22 con CAC de 2442 mg/g y proteinuria en rango nefrótico de 5 g en 24 horas. Tras el inicio del Belimumab, presenta en seguimiento en consulta mejoría de CAC de 293.6 mg/g, proteinuria a 0.6 g, antiDNA 11.6.

3.- Proteinuria de 4935 mg/g y anticuerpos antiDNA de 127, presenta recaída en 09/22 con CAC de 6848.9 mg/g y proteinuria en rango nefrótico de 16 g en 24 horas. Tras el inicio del Belimumab, presenta en seguimiento en consulta mejoría de CAC de 26 mg/g, proteinuria a 0.18 g, antiDNA 19.

4 y 5.- Proteinuria de 4227 mg/g y 1123 mg/g y 6.89 g en 24 horas y 4.3 g en 24 horas, anticuerpos antiDNA de 241 y >600. Tras el inicio del Belimumab, presenta en seguimiento en consulta mejoría de CAC de 58.7 mg/g y 5.54 mg/g, proteinuria a 0.23 g y 0.07 g, antiDNA a 29.2 y 5.8, respectivamente.

6.- CAC de 6143 mg/g, proteinuria de 16 g en 24 horas, anticuerpos antiDNA de >600. Tras el inicio del Belimumab, presenta en seguimiento en consulta CAC de 73.48 mg/g, proteinuria a 0.62 g, antiDNA 83.2.

Conclusiones: Podemos observar como tras el inicio del Belimumab añadido al resto de la terapia inmunosupresora y cardionefroprotectora, todos los pacientes estudiados se logra una remisión completa.