

Eficacia de los iSGLT-2 para mejorar parámetros congestivos y control tensional en pacientes en hemodialisis. Serie de casos.

Sbardella Sánchez, Gabriel¹; Prados Soler, María Carmen¹; Delgadillo Limón, Marco Valentín¹; Panadero Moya, Marta¹; Duarte Martínez, Ana Dolores¹;

(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS

Palabras clave / Términos relevantes:

iSGLT-2, Congestión, tensión arterial

RESUMEN

Introducción: Describir la mejoría del proBNP y el control tensional luego del inicio de los iSGLT-2 en pacientes con IC y ERCT en programa crónico de HD.

Casos clínicos y resultados: Se incluyeron 5 pacientes que pertenecen al programa de hemodiálisis del Hospital Universitario Torrecárdenas, de los cuales el 100% de los mismos son hombres en torno a los 60 años (/-10), diuresis residual >500 cc y FEVI tanto reducida como conservada.

El paciente 1 tenía un proBNP de >35000 y TA en torno a 170/90 mmHg previo al inicio del fármaco, posterior al inicio del fármaco, se evidencia en controles analíticos posteriores un descenso del proBNP hasta 18940 y mejora de cifras tensionales en torno a 140/80 mmHg.

El paciente 2 tenía un proBNP de >35000 y TA en torno a 180/100 mmHg previo al inicio del fármaco, posterior al inicio del fármaco, se evidencia en controles analíticos posteriores un descenso del proBNP hasta 826 y mejora de cifras tensionales en torno a 160/90 mmHg.

El paciente 3 tenía un proBNP de >70000 y TA en torno a 160/90 mmHg previo al inicio del fármaco, posterior al inicio del fármaco, se evidencia en controles analíticos posteriores un descenso del proBNP hasta 14637 y mejora de cifras tensionales en torno a 130/80 mmHg.

El paciente 4 tenía un proBNP de >70000 y TA en torno a 160/100 mmHg previo al inicio del fármaco, posterior al inicio del fármaco, se evidencia en controles analíticos posteriores un descenso del proBNP hasta 18940 y mejora de cifras tensionales en torno a 140/80 mmHg.

Conclusiones: Tras el inicio de los iSGLT-2, añadido al demás tratamiento cardionefroprotector, podemos observar mejora tanto en parámetros congestivos como de control de cifras tensionales en los pacientes estudiados.